

BLASTOMICOSIS



La blastomycosis es una infección fúngica causada por *Blastomyces dermatitidis*. Cerca de la mitad de las personas infectadas no presentan ningún síntoma. Las personas con un sistema inmunitario debilitado o una enfermedad crónica tienen una mayor probabilidad de tener síntomas. Se encuentra blastomycosis en todo Wisconsin y los estados circundantes del medio oeste, en especial en los valles de los ríos Mississippi y Ohio.



¿Cómo se contagia?

- ▶ El *Blastomyces* puede encontrarse en la tierra cerca de aguas estancadas.
- ▶ Se puede contraer blastomycosis al inhalar aire cerca de tierra que haya sido removida. Preste especial atención cuando la tierra:
 - ▶ Esté cerca de una fuente de agua y haya sido removida.
 - ▶ Se haya desplazado debido a actividades de jardinería, campamento, caza, senderismo, conducción de vehículos todoterreno y eliminación de matorrales.
 - ▶ Esté cerca de una excavación o lugar de construcción.
- ▶ Los perros pueden contraer la infección por *Blastomyces*, pero no pueden transmitirla a seres humanos.
- ▶ La blastomycosis no se puede contagiar de una persona a otra.



¿Cuáles son los signos y síntomas?

- ▶ Fiebre o escalofríos
- ▶ Tos
- ▶ Falta de aire
- ▶ Dolor de pecho o espalda
- ▶ Sensación de mucho cansancio
- ▶ Llagas en la piel que pueden verse como costras o abultadas



¿Cuáles son las opciones de tratamiento?

- ▶ Las personas reciben en general tratamiento con antimicóticos. Es necesario usar el medicamento por varios meses.
- ▶ Los antibióticos no sirven para la blastomycosis.



¿Cómo se puede prevenir?

- ▶ La mejor forma de evitar una enfermedad grave es consultar con el médico al presentar cualquier síntoma.
- ▶ Dado que no hay análisis ambientales que permitan identificar el *Blastomyces*, se recomienda que evite actividades que remuevan la tierra en zonas boscosas o a la orilla del agua.

