

后续措施： 等待 COVID-19 检测结果期间

(Next Steps: While you wait for your COVID-19 test results)

如果您接触过 COVID-19 病毒：即使您已接种最新的 COVID-19 疫苗，请佩戴合适的口罩，并在等待检测结果时观察自己是否出现症状。

如果出现了 COVID-19 症状：即使您已接种最新的 COVID-19 疫苗，在等待检测结果时与其他家庭成员隔离开，观察自己是否出现新症状或恶化症状，并佩戴合适的口罩。



保护好自己和他人

- 在等待检测结果期间应远离他人。
- 在等待检测结果期间，如果家里或者公共场所所有其他人，应佩戴合适的口罩。
- 咳嗽或打喷嚏时，请用纸巾或肘部内侧遮挡口鼻。
- 经常用肥皂和水洗手，每次不少于 20 秒。如果没有肥皂和水，也可以用含 60% 酒精的洗手液洗手。
- 每天清洁“频繁触摸”的表面（例如桌面、门把手、电话和键盘）。
- 洗手前不要用手触摸眼鼻口。



症状自我观察

- 记录所有新症状的出现时间。
- 每日量两次体温。
- 如果您生病了，请记录一天的发烧、咳嗽和所有其他症状。
- 如果症状加重，则联系医生。如果发生医疗紧急事故，则拨打 911。

您是在诊所还是在医院做的检测？



结果出来时，医生将联系您。不要联系当地健康部门了解检测结果。


欲了解更多信息，请访问 www.dhs.wi.gov/covid-19/symptoms.htm。

如何应对 COVID-19 检测结果

+ 阳性检测结果？隔离在家，与其他人隔离。

- 不要离开家。不要去上班或上学。不要旅游或搭乘公共交通。
- 告知您的密切接触者您感染了 COVID-19。您接触的家人等所有人员都应接受检测，并在接触后 10 天内在有他人的场所戴好口罩。
- 观察症状。如果您需要紧急医疗救助，立即拨打 911 并告知您感染了 COVID-19。
- 身边有其他人时，请佩戴口罩。
- 推迟非紧急的看诊。

什么时候结束隔离？



+



+



停用退烧药后，发烧症状消失
至少 24 小时之后

您的其他症状好转至
至少 24 小时之后

距最开始出现症状或者检测结果
为阳性（如果没有出现症状）至
少 5 天之后

在隔离期结束后的 5 天以内，在有他人的场所佩戴合适的口罩。如果您的症状在 5 天后没有好转，则继续隔离直到症状好转。

- 阴性检测结果？您这次似乎没有感染 COVID-19 病毒。

如果自己（抗原）检测结果呈阴性，则在首次检测 48 小时后再次进行检测。COVID-19 抗原检测结果呈阴性意味着这次检测未检测到病毒，但并不排除您可能已感染 COVID-19。

如果接触到 COVID-19，即使 COVID-19 检测结果呈阴性，请遵照这些步骤：

- 监测 COVID-19 症状。
- 在接触后 10 天时间内，请在接触其他人时佩戴好合适的口罩。

想了解更多信息吗？

- 接触 COVID-19 后的后续措施：www.dhs.wi.gov/covid-19/close-contacts.htm
- COVID-19 患者相关信息：www.dhs.wi.gov/covid-19/diagnosed.htm

