

Terapia de pareja acelerada para tratar la gonorrea

(Expedited Partner Therapy for Gonorrhea)

Información para parejas sexuales

Cuando una persona con la que ha tenido sexo está bajo tratamiento por gonorrea, usted y cualquier otra pareja sexual también pueden recibir tratamiento con la terapia de pareja acelerada de parte del proveedor de cuidados de la salud de sus parejas.

Esto es lo que necesita saber:

- La gonorrea es una sexually transmitted infection (infección de transmisión sexual) (STI). Puede contraer gonorrea al tener sexo vaginal, anal u oral.
- Muchas de las personas que la tienen no son conscientes de esto porque no presentan síntomas.
- Si no recibe tratamiento, puede enfermarse gravemente o serle más difícil tener hijos.
- Tener gonorrea durante el embarazo puede ser dañino para el bebé. Es importante recibir tratamiento.

La gonorrea es fácil de tratar. Reciba tratamiento ahora.

- Tanto usted como sus parejas sexuales deben recibir tratamiento cuanto antes. La **mejor** opción es visitar a un proveedor de cuidados de la salud de inmediato.
- A su pareja sexual le entregaron un medicamento o una receta para usted. Un proveedor de cuidados de la salud le entregó este medicamento a su pareja para que usted pueda **tratarse**.
- Si sabe que no podrá visitar a un proveedor de cuidados de la salud en los próximos días, tome el medicamento ahora mismo y siga las instrucciones que aparecen en la página 2.

Elabore un plan para hacer un seguimiento con su proveedor de cuidados de la salud.

- Es posible tener más de una STI al mismo tiempo. Es clave que se haga las pruebas de detección de las otras STI cuanto antes.
- Toda persona que haya tenido relaciones sexuales con usted en los últimos 60 días también debe hacerse el análisis.
- Hágase otro análisis en tres meses para asegurarse de que no volvió a contraer gonorrea (reinfección).


Consulte a su pareja en dónde se hizo el análisis y recibió tratamiento, o llame al departamento de salud local para saber dónde obtener atención: www.dhs.wi.gov/lh-depts/counties.htm.



“No fue fácil escuchar esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento de inmediato”.

- Paciente anónimo.

Para encontrar una clínica cerca de usted, visite www.dhs.wi.gov/std/clinics.htm o escanee el código QR.



Así se deben tomar las pastillas:

Deben haberle dado una única dosis de 800 mg de un antibiótico llamado Cefixime.

- **Tome todo este medicamento de una vez** con un vaso de agua lleno tan pronto como se lo den.
- **No comparta** ni le dé a nadie este medicamento.
- **Puede sentir mareos o tener malestar estomacal o diarrea;** estos problemas son comunes y deberían desaparecer en unos días. De lo contrario, consulte a un proveedor de cuidados de la salud.
- **Puede tener secreción o picazón vaginal;** si presenta estos síntomas, consulte a un proveedor de cuidados de la salud.



La infección tarda en desaparecer, al menos, siete días desde el inicio del tratamiento. Lo mejor es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales durante ese tiempo o mientras tenga síntomas. Si tiene relaciones sexuales durante los siete días posteriores al inicio del tratamiento, usted y su(s) pareja(s) podrían reinfectarse.

Las pastillas son muy seguras para la mayoría de las personas. Dígle a su proveedor médico si esto ocurre:

- Alguna vez tuvo una reacción desfavorable, sarpullido o alergia por tomar antibióticos.
- Tiene una enfermedad grave, como enfermedad renal, cardíaca o hepática.
- Actualmente está tomando otro medicamento recetado.

Si alguna de estas condiciones se cumple o si no puede descartarlas con total seguridad, no tome las pastillas. En su lugar, debería hablar con su proveedor de cuidados de la salud o farmacéutico cuanto antes. Ellos serán quienes definan cuál es el mejor tratamiento para usted.

Visite de inmediato a un médico, una clínica o una sala de emergencias si:

- Tiene sibilancia, vómitos o dificultad para respirar.
- Tiene un sarpullido o fiebre.
- Siente dolor al tener relaciones sexuales.
- Tiene útero y siente dolor en la parte baja del abdomen (podría ser un signo de enfermedad inflamatoria pélvica).
- Tiene dolor o hinchazón en los testículos (bolas).

Si tiene cualquiera de estos síntomas, puede significar que necesita otro medicamento o una dosis mayor, u otra evaluación de un proveedor de cuidados de la salud.

¿Tiene preguntas?

Comuníquese con su médico, farmacéutico, departamento de salud local o tribal, o envíe un correo electrónico al DHS a DHSDPHBCD@dhs.wi.gov.

