

Terapia de pareja acelerada para tratar la clamidia

(Expedited Partner Therapy for Chlamydia)

Información sobre la azitromicina para parejas sexuales

Una persona con la que tuvo relaciones sexuales ha tomado medicamentos para curarse la clamidia. Es posible que usted también tenga clamidia. Tome los medicamentos lo antes posible para curar cualquier infección que pueda haber comenzado.

La clamidia es una infección muy frecuente que se contrae por tener relaciones sexuales vaginales, anales y/u orales.

- La clamidia puede causar dolor o secreción (goteo).
- En muchas personas, la clamidia no produce síntomas. Esto significa que muchas personas tienen clamidia y no lo saben.
- Tener clamidia durante el embarazo o el parto puede ser perjudicial para el bebé. Es importante recibir tratamiento.


La clamidia es fácil de tratar. Reciba tratamiento ahora.

- Tanto usted como sus parejas sexuales deben comenzar a tomar de inmediato medicamentos según lo indicado. Si no recibe tratamiento, puede enfermarse gravemente o reducir sus probabilidades de quedar embarazada en el futuro.
- La mejor manera de tratar esta sexually transmitted infection (infección de transmisión sexual, STI) es visitar una clínica o a un proveedor de atención médica de inmediato. Es importante que surta la receta de los medicamentos que usted o su pareja retiró de la farmacia y que los tome si no puede ir a una clínica en los próximos días.

Organícese para hacerse el análisis ahora.

- El análisis no causa dolor. Solo tiene que orinar en un recipiente.
- Toda persona que haya tenido relaciones sexuales con usted en los últimos 60 días también debe hacerse el análisis.
- Hágase otro análisis en tres meses para asegurarse de que no volvió a contraer clamidia (reinfección).
- Como las personas pueden tener más de una STI al mismo tiempo, es importante que se haga análisis de otras STI lo antes posible.


Consulte a su pareja en dónde se hizo el análisis y recibió tratamiento, o llame al departamento de salud local para obtener información sobre dónde podría recibir atención: www.dhs.wi.gov/lh-depts/counties.htm.



“No fue fácil escuchar esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento de inmediato”.

- Paciente anónimo.

Busque una clínica cerca de usted en www.dhs.wi.gov/std/clinics.htm o escaneando el código QR.



Así se deben tomar las pastillas:

Le deberían dar 1 g (1000 mg) de azitromicina. Tome la(s) pastilla(s) según las indicaciones.

- **Tome un vaso entero de agua e ingiera comida con cada dosis.** Al acompañar las pastillas con comida, es menos probable que le generen malestar estomacal o vómitos, y el medicamento actuará mejor en el organismo.
- **Evite los antiácidos** una hora antes o dos horas después de tomar la azitromicina. Los antiácidos (como Tums, Roloids o Maalox) disminuyen la absorción del medicamento en el organismo, lo que hace que sea menos eficaz.

La infección tarda en desaparecer, al menos, siete días desde el inicio del tratamiento.

Lo mejor es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales durante ese tiempo o mientras tenga síntomas. Si tiene relaciones sexuales durante los siete días posteriores al inicio del tratamiento, usted y su(s) pareja(s) podrían reinfectarse.



Las pastillas son muy seguras para la mayoría de las personas. Dígale a su proveedor médico si:

- alguna vez tuvo una reacción desfavorable, sarpullido o alergia por tomar antibióticos;
- tiene una enfermedad grave, como enfermedad renal, cardíaca o hepática;
- actualmente está tomando otro medicamento recetado;
- está o podría embarazada;
- está en período de lactancia.

Visite de inmediato a un médico, una clínica o una sala de emergencias si:

- tiene sibilancia, vómitos o dificultad para respirar;
- tiene un sarpullido o fiebre;
- siente dolor al tener relaciones sexuales;
- tiene útero y siente dolor en la parte baja del abdomen. podría ser un signo de enfermedad inflamatoria pélvica;
- tiene dolor o hinchazón en los testículos (bolas).

Si tiene cualquiera de estos síntomas, podría significar que necesita otro medicamento o una dosis mayor, u otra evaluación de un proveedor de atención médica.

¿Tiene preguntas?

Comuníquese con su médico, farmacéutico, departamento de salud local o tribal, o envíe un correo electrónico al DHS a DHSDPHBCD@dhs.wi.gov.

