

Terapia de pareja acelerada para la clamidia

Información sobre la doxiciclina para parejas sexuales

(Expedited Partner Therapy for Chlamydia)

Una persona con la que tuvo relaciones sexuales ha tomado medicamentos para curarse la clamidia. Es posible que usted también tenga clamidia. Tome los medicamentos lo antes posible para curar cualquier infección que pueda haber comenzado.

La clamidia es una infección muy frecuente que se contrae por tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

- La clamidia puede causar dolor o secreción (goteo).
- En muchas personas, la clamidia no produce síntomas. Esto significa que muchas personas tienen clamidia y no lo saben.
- Tener clamidia durante el embarazo o el parto puede ser perjudicial para el bebé. Es importante recibir tratamiento.

La clamidia es fácil de tratar. Reciba tratamiento ahora.


- Tanto usted como sus parejas sexuales deben comenzar a tomar de inmediato medicamentos según lo indicado. Si no recibe tratamiento, puede enfermarse gravemente o reducir sus probabilidades de quedar embarazada en el futuro.
- La mejor manera de tratar esta sexually transmitted infection (infección de transmisión sexual, STI) es visitar una clínica o a un proveedor de atención médica de inmediato. Es importante que surta la receta de los medicamentos que usted o su pareja retiró de la farmacia y que los tome si no puede ir a una clínica en los próximos días.

Organícese para hacerse el análisis ahora.

- El análisis no causa dolor. Solo tiene que orinar en un recipiente.
- Toda persona que haya tenido relaciones sexuales con usted en los últimos 60 días también debe hacerse el análisis.
- Hágase otro análisis en tres meses para asegurarse de que no volvió a contraer clamidia (reinfeción).
- Como las personas pueden tener más de una STI al mismo tiempo, es importante que se haga análisis de otras STI lo antes posible.

Consulte a su pareja en dónde se hizo el análisis y recibió tratamiento, o llame al departamento de salud local para saber dónde obtener atención:

www.dhs.wi.gov/lh-depts/counties.htm.




“No fue fácil escuchar esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento de inmediato”.

- Paciente anónimo.

Encuentre una clínica cerca de usted en www.dhs.wi.gov/std/clinics.htm

o escaneando el código QR.



Así se deben tomar las pastillas:

Le deberían dar 100 mg de doxiciclina. Tome una pastilla dos veces al día durante siete días.

- **Tome cada dosis con un vaso entero de agua y con el estómago vacío** (una hora o dos horas después de comer). Si la toma de doxiciclina le causa malestar estomacal, puede tomarla con la comida.
- **Evite consumir lácteos** (como leche y queso), calcio, antiácidos o suplementos multivitamínicos dos horas antes o después de tomar doxiciclina, ya que estos reducen la absorción del medicamento, lo que lo hace menos eficaz.
- **Manténgase erguido** (sentado o parado) durante 30 minutos después de tomar doxiciclina para prevenir una irritación de la garganta.
- **Use protector solar cuando esté al sol.** La doxiciclina puede causar una mayor sensibilidad de la piel a la luz solar, aunque sea durante períodos cortos.

Los anticonceptivos hormonales podrían no ser tan eficaces mientras toma doxiciclina. Use otros métodos anticonceptivos mientras toma doxiciclina.



La infección tarda en desaparecer, al menos, siete días desde el inicio del

tratamiento. Lo mejor es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales durante ese tiempo o mientras tenga síntomas. Si tiene relaciones sexuales durante los siete días posteriores al inicio del tratamiento, usted y su pareja podrían reinfectarse.

Las pastillas son muy seguras para la mayoría de las personas.

Dígale a su proveedor médico si:

- alguna vez tuvo una reacción desfavorable, sarpullido o alergia por tomar antibióticos;
- tiene una enfermedad grave, como enfermedad renal, cardíaca o hepática;
- actualmente está tomando otro medicamento recetado;
- está o podría estar embarazada;
- está en período de lactancia.

Visite de inmediato a un médico, una clínica o una sala de emergencias si:

- tiene sibilancia, vómitos o dificultad para respirar;
- tiene un sarpullido o fiebre;
- siente dolor al tener relaciones sexuales;
- tiene dolor en la parte baja del abdomen y tiene útero. (podría ser un signo de enfermedad inflamatoria pélvica);
- tiene dolor o hinchazón en los testículos (bolas).

Si tiene cualquiera de estos síntomas, podría significar que necesita otro medicamento o una dosis mayor, u otra evaluación de un proveedor de atención médica.

¿Tiene preguntas?

Comuníquese con su médico, farmacéutico, departamento de salud local o tribal, o envíe un correo electrónico al DHS a DHSDPHBCD@dhs.wi.gov.

