

Terapia de pareja acelerada para la tricomoniasis (o “trich”)

(Expedited Partner Therapy for Trichomoniasis (or Trich))

Información para parejas sexuales

Una persona con la que ha tenido relaciones sexuales tomó medicamentos para tratar una infección llamada "tricomoniasis". Posiblemente, usted también la tenga. Es muy importante que reciba tratamiento para esta infección cuanto antes.

La tricomoniasis es una infección muy común que se contagia a través de las relaciones sexuales.

- Muchas de las personas que la tienen no son conscientes de esto porque no presentan síntomas.
- Es posible que algunas personas presenten síntomas. Algunos de estos son el ardor al orinar, la picazón y las secreciones del pene o la vagina.

La tricomoniasis es muy fácil de tratar. Reciba tratamiento ahora.

- Tanto usted como sus parejas sexuales deben recibir tratamiento cuanto antes. La **mejor** opción es visitar a un proveedor de cuidados de la salud de inmediato.
- A su pareja sexual le entregaron un medicamento o una receta para usted. Un proveedor de cuidados de la salud le entregó este medicamento a su pareja para que **usted** pueda tratarse.
- Si sabe que no podrá visitar a un proveedor de cuidados de la salud en los próximos días, tome el medicamento ahora mismo y siga las instrucciones que aparecen en la página 2.

Planifique hacerse una prueba de detección cuanto antes.

- Es clave que haga un seguimiento con su proveedor de cuidados de la salud, incluso después de haber tomado el medicamento que recibió de su pareja.
- Es posible tener más de una sexually transmitted infection (infección de transmisión sexual, STI) al mismo tiempo. Es clave que se haga las pruebas de detección de las otras STI cuanto antes.
- Toda persona que haya tenido relaciones sexuales con usted en los últimos 60 días también deberá hacerse las pruebas.

Consulte a su pareja en dónde se hizo el análisis y recibió tratamiento, o llame al departamento de salud local para obtener información sobre dónde recibir tratamiento: www.dhs.wi.gov/lh-depts/counties.htm.



“No fue fácil escuchar esto, pero me alegro de haber recibido tratamiento de inmediato”.

- Paciente anónimo

Busque una clínica cerca de usted en: www.dhs.wi.gov/std/clinics.htm o escaneando el código QR.



Así se deben tomar las pastillas:

La receta o el medicamento que tiene son para metronidazol (también conocido como "Flagyl"). Tome la(s) pastilla(s) según las indicaciones.

- **Tome un vaso entero de agua e ingiera comida con cada dosis.** Si ingiere comida con cada pastilla, reduce la probabilidad de sufrir malestar estomacal. Esto también sirve para que el medicamento actúe mejor en el cuerpo.
- **El consumo de alcohol junto con la toma de este medicamento podría provocarle mucho malestar.** No tome las pastillas si ha consumido alcohol hasta 12 horas antes. No consuma alcohol en las 24 horas posteriores a la toma del medicamento, como mínimo.

Es posible volver a contagiarse de tricomoniasis, incluso después de haber tomado el medicamento indicado.

Se recomienda no tener relaciones sexuales hasta que usted y sus parejas sexuales hayan tomado el medicamento y los síntomas hayan desaparecido.



Las pastillas son muy seguras para la mayoría de las personas. Usted no debería tomar las pastillas en los siguientes casos:

- alguna vez tuvo una reacción desfavorable, sarpullido o alergia por tomar antibióticos;
- tiene una enfermedad grave, como enfermedad renal, cardíaca o hepática;
- actualmente está tomando otro medicamento recetado;
- está o puede estar transitando un embarazo o amamantando, o si
- tiene dolor en la pelvis o la parte baja del abdomen, dolor o hinchazón en los testículos, dolor durante las relaciones sexuales, vómitos o fiebre.

Si alguna de estas condiciones se cumple o si no puede descartarlas con total seguridad, no tome las pastillas. En su lugar, debería hablar con su proveedor de cuidados de la salud o farmacéutico cuanto antes. Ellos serán quienes definan cuál es el mejor tratamiento para usted.

Estos son los posibles efectos secundarios de este medicamento:

La mayoría de las personas no tendrá ninguno de estos problemas cuando tome el medicamento. Es posible que algunas tengan efectos secundarios leves, como mareo, la boca seca o cambios en el gusto, dolor de cabeza, malestar estomacal o diarrea. Estos problemas no son graves y desaparecerán por sí solos.

Señales de una reacción alérgica:

Es poco frecuente que se presente una reacción alérgica. Entre las señales posibles, están sentir dificultad para respirar, que se cierra la garganta, hinchazón de los labios o la lengua, o ronchas o manchas rojas que pican en la piel (lo que se conoce como urticaria). Estos son problemas graves. Si tiene alguno de ellos, llame al 911 o acérquese a la sala de emergencias más cercana.

¿Tiene preguntas?

Comuníquese con su médico, farmacéutico, departamento de salud local o tribal, o envíe un correo electrónico al DHS a DHSDPHBCD@dhs.wi.gov.

