

Usted haría cualquier cosa por proteger a su familia.



APROXIMADAMENTE 1 EN 12 MAMÁS INFECTADAS CON EL VIRUS E ZIKA TIENEN BEBÉS CON DEFECTOS DE NACIMIENTO

Tome medidas para protegerse a usted y a sus seres queridos contra el virus de **Zika** y otras enfermedades.



Si usted o su pareja esta embarazada o piensa estarlo, **NO VIAJE** a un lugar donde se está propagando esta enfermedad.



El Zika puede transmitirse por vía **sexual**. Puede transmitirse de una persona infectada con Zika a su pareja. La transmisión sexual puede ser por vía vaginal, anal y por sexo oral, así como al compartir juguetes sexuales.



Zika puede estar en sitios donde no lo espera. Verifique si el área donde viaja es un lugar afectado por el Zika:

<https://www.cdc.gov/zika/geo/>



Use preservativo. El virus del Zika puede transmitirse por vía sexual, por lo tanto, si tiene sexo, use preservativo. La transmisión sexual puede ser por vía vaginal, anal y por sexo oral, así como al compartir juguetes sexuales.



El Zika puede provocar defectos de nacimiento. El Zika puede transmitirse de la mujer embarazada al feto. No se conocen las probabilidades de tener un bebé con defectos de nacimiento después de una infección prenatal con el virus de Zika.



El Zika puede transmitirse incluso aunque no se presenten síntomas. El 80% de la población con Zika no tiene síntomas. El Zika puede transmitirse durante semanas o meses después de la infección.

