

CÓMO ADMINISTRAR NALOXONA POR VÍA NASAL

(HOW TO ADMINISTER NASAL NALOXONE)



911


Llame al 911 y siga las instrucciones del operador. Brinde respiraciones de rescate, en caso de que sean necesarias. Continúe brindando las respiraciones cada 5 o 6 segundos.



Coloque la punta de la boquilla de naloxona en cualquiera de las fosas nasales hasta que sus dedos toquen la nariz.



Presione firmemente el émbolo para liberar la dosis de naloxona.



Si la persona no responde después de 2-3 minutos, administre una segunda dosis. Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda.

SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES



Ausencia de respuesta o pérdida del conocimiento



Respiración lenta o ausencia de respiración



Ronquidos o ruidos vibrantes



Piel fría o pegajosa



Pérdida de color en labios y uñas



Línea de ayuda para la recuperación de adicciones de Wisconsin

Llame al:

211 o al 833-944-4673

Envíe:

su código postal al 898211

En línea:

addictionhelpwi.org



DoseOfRealityWI.gov



**dose
of
reality**

Prevenir los daños que causan los opioides. Comienza con conversaciones reales.

P-03094AS (09/2023)