



# SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES

(SIGNS OF AN OPIOID  
OVERDOSE)

## Cuándo tomar medidas



Ausencia de  
respuesta o pérdida  
del conocimiento



Respiración lenta  
o ausencia de  
respiración



Ronquidos o ruidos  
vibrantes



Piel fría o pegajosa



Pérdida de color  
en labios y uñas

## La recuperación es posible.

Línea de ayuda para la recuperación de  
adicciones de Wisconsin

Llame al: 211 o al 833-944-4673

Envíe su código postal al 898211.

En línea: [www.addictionhelpwi.org](http://www.addictionhelpwi.org)

Para acceder a recursos, visite nuestro sitio web en  
[DoseOfRealityWI.gov](http://DoseOfRealityWI.gov).



WISCONSIN DEPARTMENT  
of HEALTH SERVICES



# CÓMO ADMINISTRAR NALOXONA POR VÍA NASAL



(HOW TO ADMINISTER NASAL NALOXONE)

**Revierta una sobredosis de opioides  
y evite la muerte.**



**Llame al 911** y siga las instrucciones del operador. Brinde respiraciones de rescate, en caso de que sean necesarias. Continúe brindando las respiraciones cada 5 o 6 segundos.



Coloque la punta de la boquilla de naloxona en cualquiera de las fosas nasales hasta que sus dedos toquen la nariz.



Presione firmemente el émbolo para liberar la dosis de naloxona.



Si la persona no responde después de 2-3 minutos, administre una segunda dosis. Permanezca con la persona hasta que llegue la ayuda.

**No está solo.  
Existe ayuda disponible  
24/7.**

Para acceder a recursos,  
visite nuestro sitio web en  
[DoseOfRealityWI.gov](http://DoseOfRealityWI.gov).



WISCONSIN DEPARTMENT  
of HEALTH SERVICES



dose  
of  
reality