

Gonorrhea

Neisseria gonorrhoeae



La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria y puede curarse. Es la segunda ETS más común reportada en Wisconsin. Las personas pueden tener gonorrea sin tener síntomas durante meses si no reciben tratamiento. Las mujeres pueden dañar los órganos reproductivos. Los hombres y las mujeres pueden transmitir gonorrea a sus parejas sexuales. Puede contraer gonorrea nuevamente después del tratamiento y la gonorrea puede aumentar el riesgo de contraer el VIH.



¿Cómo se contagia y quién contrae gonorrea?

- ▶ La gonorrea se transmite al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que la tiene. Los bebés pueden contraer gonorrea durante el parto si la madre también la tiene.
- ▶ Si tiene relaciones sexuales, puede contraer gonorrea; Sin embargo, hay grupos de personas con mayor probabilidad de contraer gonorrea:
 - Jóvenes que tienen relaciones sexuales.
 - Si usted o su pareja sexual tienen alguna ETS, también pueden contraer gonorrea.
 - Si tiene más de una pareja sexual y/o una nueva pareja sexual.



¿Cuáles son los signos y los síntomas?

- ▶ La mayoría de las personas NO tienen síntomas cuando tienen gonorrea, pero se enteran cuando se hacen la prueba.
- ▶ Los hombres y las mujeres pueden tener una sensación de ardor al orinar, secreción o secreción del pene o vaginal. Los hombres también pueden sentir que necesitan orinar con más frecuencia. Las mujeres pueden tener dolor en la parte baja de la espalda y/o manchar entre períodos. Si tiene estos síntomas, generalmente es en 3 a 10 días después de tener relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea.



¿Cuáles son las opciones de prueba y tratamiento?

- ▶ Puede hacerse la prueba de gonorrea en el consultorio de un médico, en una clínica de planificación familiar o en una clínica de ETS. Hacerse la prueba y el tratamiento temprano puede prevenir problemas graves y detener la propagación de la gonorrea. Si tiene gonorrea, haga que sus parejas sexuales recientes de los últimos tres meses sean examinadas Y tratadas. Es posible que no tengan síntomas, pero aún tienen gonorrea. Si tiene relaciones sexuales con la misma pareja, puede volver a infectarse a menos que su pareja se haga la prueba y el tratamiento.
- ▶ Puede recibir tratamiento con una dosis única de ceftriaxona y azitromicina. Las mujeres que no reciben tratamiento pueden contraer la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), que es muy dolorosa. La EPI puede hacer que sea difícil tener un bebé y causar tejido cicatricial que puede provocar embarazos ectópicos. En los hombres, puede provocar dolor en los testículos y esterilidad. Tanto los hombres como las mujeres que no reciben tratamiento pueden tener artritis dolorosa.





¿Cómo puedo evitar contraer gonorrea?

► Hay muchas maneras de prevenir la gonorrea y es tan fácil como **1, 2, 3:**

1. Abstinencia, en otras palabras, no tener relaciones sexuales.
2. Sea monógamo o tenga relaciones sexuales con una sola persona que solo tenga relaciones sexuales con usted y que no tenga ninguna ETS. Puede averiguar si ambos tienen una ETS como la gonorrea haciéndose la prueba juntos.
3. Los condones pueden protegerlo de contraer gonorrea, pero solo donde cubren. Si no los está usando para el sexo oral, aún puede contraer gonorrea.

