

Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

(Haemophilus Influenzae Type B (Hib))



La *Haemophilus influenzae* tipo B (Hib) es una bacteria que puede producir muchos tipos diferentes de infecciones. Las infecciones pueden ser leves, como una infección de oído, o potencialmente mortales en niños menores de 5 años. La Hib fue en su momento la causa más común de infección bacteriana grave en niños. Gracias a la aplicación difundida de la vacuna contra la Hib, son pocos los casos reportados cada año.

¿Cómo se propaga?



- ▶ Las bacterias Hib a menudo viven en la nariz y la garganta de las personas sin causar problema alguno. En casos poco frecuentes, la bacteria puede propagarse a otras partes del cuerpo y causar una enfermedad.
- ▶ La bacteria Hib se propaga a través de las gotitas respiratorias. Cuando las personas enfermas tosen o estornudan, se expulsan pequeñas gotas respiratorias que contienen la bacteria, y las personas que están cerca pueden aspirarlas.

¿Cuáles son los signos y síntomas?



- ▶ Los síntomas de la infección de Hib pueden incluir fiebre, cansancio, vómitos y rigidez en el cuello. La presencia de otros síntomas depende de la parte del cuerpo que esté infectada.
- ▶ Síntomas de la **meningitis**, infección del revestimiento del cerebro y de la médula espinal, incluidos:
 - ▶ Fiebre
 - ▶ Rigidez en el cuello
 - ▶ Dolor de cabeza
 - ▶ Confusión
- ▶ Síntomas de la **neumonía**, infección del pulmón, incluidos:
 - ▶ Fiebre y escalofríos
 - ▶ Tos
 - ▶ Respiración acelerada o dificultad para respirar
 - ▶ Dolor de pecho

¿Cómo se diagnostica y se trata?



- ▶ La Hib se diagnostica por medio de muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo u otros fluidos del cuerpo, que se obtienen a través de análisis de laboratorio.
- ▶ La enfermedad por Hib puede tratarse con antibióticos.
- ▶ Las personas que tienen la enfermedad por Hib pueden necesitar atención en un hospital según la gravedad de la infección.

¿Cómo se puede prevenir?



- ▶ **La mejor forma de prevenir la enfermedad por Hib es vacunándose.** La vacuna es segura y muy efectiva para la prevención de la enfermedad por Hib.
- ▶ Se recomienda que todos los niños menores de 5 años se vacunen contra la Hib. Las dosis de la vacuna se ponen a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, y luego se pone un refuerzo entre los 12 y 15 meses.
- ▶ Si cuando su hijo era bebé no se vacunó contra la Hib, hable con un médico.

