

Gonorrhea

Neisseria gonorrhoeae

(Gonorrhea Neisseria gonorrhoeae)



La gonorrea es una sexually transmitted disease (enfermedad de transmisión sexual, STD) causada por una bacteria y puede curarse. Es la segunda STD más común reportada en Wisconsin. Las personas pueden tener gonorrea sin tener síntomas durante meses si no reciben tratamiento. En las mujeres, puede ocasionar daños en los órganos reproductivos. Los hombres y las mujeres pueden transmitir gonorrea a sus parejas sexuales. Después de recibir el tratamiento, puede volver a contraer gonorrea y esta puede aumentar el riesgo de contraer HIV.



¿Cómo se transmite la gonorrea y quién la contrae?

- ▶ La gonorrea se transmite mediante el sexo vaginal, anal u oral con una persona que la tiene. Los bebés pueden contraer gonorrea al nacer si la madre también la tiene.
- ▶ Si tiene relaciones sexuales, puede contraer gonorrea. Sin embargo, hay grupos de personas que son más propensas a contraerla:
 - Personas jóvenes que tienen relaciones sexuales.
 - Si usted o su pareja sexual tienen **alguna** STD, también pueden contraer gonorrea.
 - Si tiene más de una pareja sexual o una pareja sexual nueva.



¿Cuáles son los signos y síntomas?

- ▶ La mayoría de las personas NO tienen síntomas cuando tienen gonorrea, pero se enteran cuando se hacen una prueba.
- ▶ Los hombres y las mujeres pueden tener una sensación de ardor al orinar, flujo, o secreción del pene o la vagina. Los hombres también pueden sentir la necesidad de orinar con más frecuencia. Las mujeres pueden tener dolor lumbar o sangrado entre periodos menstruales. Si tiene estos síntomas, suelen presentarse entre 3 y 10 días después de tener relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea.



¿Cuáles son las opciones de prueba y tratamiento?

- ▶ Puede hacerse una prueba de gonorrea en el consultorio de un médico, en una clínica de planificación familiar o en una clínica de STD. Hacerse una prueba y recibir tratamiento temprano puede prevenir problemas graves y puede detener la transmisión de gonorrea. Si tiene gonorrea, haga que sus parejas sexuales de los últimos tres meses se hagan una prueba Y reciban tratamiento. Es posible que no tengan síntomas, pero que tengan gonorrea. Si tiene relaciones sexuales con la misma pareja sexual, puede contagiarse nuevamente a menos que esa persona se haga una prueba y reciba tratamiento.
- ▶ Puede recibir tratamiento con una dosis única de ceftriaxona (Rocephin). Es posible que las mujeres que no reciben tratamiento, contraigan la pelvic inflammatory disease (enfermedad pélvica inflamatoria, PID), que es muy dolorosa. La PID puede dificultar la posibilidad de tener un bebé y causar tejido cicatricial, lo que puede provocar embarazos ectópicos. En los hombres, puede ocasionar dolor en los testículos y esterilidad. Los hombres y las mujeres que no reciban tratamiento, pueden contraer artritis dolorosa.



¿Cómo puedo evitar contraer gonorrea?

- ▶ Existen muchas formas de evitar contraer gonorrea y es tan fácil como contar hasta 3:
 - 1 Evitar tener relaciones sexuales hasta que se sienta preparado para protegerse. Por ejemplo:
 - 2 Sea monógamo o tenga relaciones sexuales con una sola persona que solo tenga relaciones sexuales con usted y no tenga ninguna STD. Pueden hacerse una prueba juntos para averiguar si ambos tienen una STD, como la gonorrea.
 - 3 Los preservativos pueden protegerle de contraer gonorrea, pero solo en las partes que cubren. Si no los usa para el sexo oral, puede contraer gonorrea.

