


Sífilis

Treponema Pallidum



La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria y puede curarse con penicilina u otros antibióticos. Se puede volver a contraer la sífilis incluso después del tratamiento y puede aumentar considerablemente el riesgo de contraer el VIH. Las personas pueden tener sífilis sin tener síntomas durante años si no reciben tratamiento. Las mujeres embarazadas pueden transmitir la sífilis a sus bebés. Los hombres y las mujeres pueden transmitir la sífilis a sus parejas sexuales.



¿Cómo se contagia y quién contrae sífilis?

- ▶ La sífilis se transmite al tocar un chancro que es una pequeña llaga indolora que se encuentra en el pene o en la vagina, recto o boca. Los bebés pueden contraer sífilis durante el embarazo si la madre también la tiene.
- ▶ Si tiene relaciones sexuales, puede contraer sífilis; Sin embargo, hay grupos de personas con mayor probabilidad de contraer sífilis:
 - Hombres a quienes les gusta tener sexo con otros hombres.
 - Personas viviendo con VIH.
 - Las personas con una pareja sexual que tiene una ETS, más de una pareja sexual y /o una nueva pareja sexual.



¿Cuáles son los signos y síntomas?

- ▶ La mayoría de las personas NO tienen síntomas cuando tienen sífilis, pero se enteran cuando se hacen la prueba.
- ▶ Una persona puede tener una llaga pequeña e indolora llamada chancro que se encuentra en el pene o en la vagina, el recto o la boca. El chancro durará unas tres semanas antes de que sane. Luego, una persona puede tener una erupción que puede confundirse con otras erupciones cutáneas y puede durar unas cuatro semanas. La erupción sanará, pero las personas con sífilis sin tratar pueden sufrir efectos muy graves en la salud.



¿Cuáles son las opciones de prueba y tratamiento?

- ▶ Puede hacerse la prueba de sífilis en el consultorio de un médico, en una clínica de planificación familiar o en una clínica de ETS. Hacerse la prueba y el tratamiento temprano puede prevenir problemas y detener la propagación de la sífilis. Si tiene sífilis, haga que sus parejas sexuales recientes de los últimos tres meses sean examinadas Y tratadas. Es posible que no presenten síntomas ni los resultados ser positivos, pero aún tienen sífilis. Si tiene relaciones sexuales con la misma pareja, puede infectarse a menos que se hagan pruebas y se traten.
- ▶ Puede recibir tratamiento con penicilina o doxiciclina. Cuanto más tiempo tenga sífilis, más tratamiento necesitará. Si no se trata, el daño que puede causar la sífilis incluye: pérdida de la vista o la audición, daño al corazón y otros órganos, enfermedades mentales e incluso la muerte. Las mujeres embarazadas con sífilis sin tratar pueden tener un aborto espontáneo o una muerte fetal.



¿Cómo puedo evitar contraer sífilis?

- ▶ Hay muchas formas de prevenir la sífilis y es tan fácil como **1, 2, 3**:
 1. **Abstinencia**, en otras palabras, no tenga relaciones sexuales.
 2. **Sea monógamo** o tenga relaciones sexuales con una sola persona que solo tenga relaciones sexuales con usted y que no tenga ninguna ETS. Puede averiguar si ambos tienen una ETS como la sífilis haciéndose la prueba juntos.
 3. **Los condones** pueden protegerlo contra la sífilis, pero solo donde cubren. Si no los está utilizando para el sexo oral, aún puede contraer sífilis.

