

Proteger a su bebé contra la hepatitis B

¿Cómo puedo proteger a mi bebé contra el virus de la hepatitis B?

- Es importante proteger a todos los bebés del virus de la hepatitis B. Para estar totalmente protegidos, los bebés necesitan tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B temprano en la vida.
- Los bebés deben recibir la primera dosis de la vacuna al nacer, una segunda dosis a los 2 meses de vida y una tercera dosis a los 6 meses de vida.
- Cuando se administran las tres dosis, la vacuna contra la hepatitis B brinda protección completa a los niños pequeños.



¿Por qué deben vacunarse los bebés contra la hepatitis B?

- Es probable que los niños infectados al nacer, o a una edad muy temprana, se conviertan en portadores. Un portador es alguien que no puede deshacerse del virus de su cuerpo.
- A pesar de que los portadores pueden verse y sentirse bien, pueden transmitirles el virus a otras personas. Es probable que los portadores sufran daños en el hígado y presenten cáncer de hígado, y que mueran a una edad joven. Por eso es tan importante inmunizar a su bebé contra la hepatitis B temprano en la vida.



¿Cuáles son los signos y síntomas?

- La hepatitis B es una enfermedad silenciosa, lo que significa que a menudo no tiene ningún signo o síntoma.
- Si una persona tiene signos y síntomas, puede incluir sensación de cansancio o sensación de que necesitan vomitar, no querer comer o beber, y/o la piel y los ojos que se vuelven amarillos y dolor en todo el cuerpo.



¿Cómo se contagia la hepatitis B a los bebés o niños pequeños?

- De la sangre de una madre infectada durante el nacimiento (vea a continuación para más información).
- Al ser cuidado por una persona infectada a través de líquidos corporales (como sangre, lo que incluye sangre menstrual, semen y líquido de la vagina).

¿Cómo puedo rastrear las vacunas de mi bebé?

- El registro de su hijo también puede encontrarse en el Registro de Inmunización de Wisconsin (Wisconsin Immunization Registry, WIR). Visite <https://www.dhswir.org> y desplácese hasta el Acceso público de registros de inmunización (Public Immunization Record Access).
- Traiga este registro con usted cada vez que visite a su médico o departamento de salud pública para recibir inmunizaciones.





¿Qué necesitan saber las mujeres embarazadas?

- Una mujer embarazada puede portar el virus de la hepatitis B sin saberlo. Ella puede transmitirle el virus a su bebé durante el parto.
- Las mujeres embarazadas deben someterse a una prueba de hepatitis B al menos una vez durante cada embarazo. El hospital donde una mujer da a luz debe conocer los resultados de la prueba transmitido a su bebé. Si es portadora, el personal del hospital tendrá que tomar medidas para evitar que el virus se le transmita al bebé.
- Estos pasos incluyen darle al bebé ciertos medicamentos y la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 12 horas después de nacer.

